Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES N° 1 - 14 avril 1987

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les
SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

APIONS : INFESTATIONS SOUVENT IMPORTANTES

PHYTONOMES : REMONTÉE DES POPULATIONS AVEC LOCALEMENT DES ATTAQUES SÉRIEUSES.

1. EN ZONES PRÉCOCES, CÔTIÈRES : INTERVENIR RAPIDEMENT
2. EN ZONES TARDIVES : INTERVENTION À PRÉVOIR DANS LES PROCHAINS JOURS SI LES TEMPÉRATURES RESTENT ÉLEVÉES.

Les seuils de nuisibilité de 100 adultes (apions) et de 100 larves (phytonomes) sont :

- souvent dépassés en zone côtière (Narbonnais, Biterrois,...)
- atteints ou en voie de l'être dans le Piscenois et l'Est de Montpellier.

Les populations sont en nette progression dans le Nord du Gard et l'Ouest Audois. Dans ces situations qui sont les plus tardives, les traitements ne devraient pas intervenir avant 8 à 10 jours.

T R A I T E Z à l'aide d'une spécialité contenant du :

- lindane à 400-600 g/ha
- méthidathion à 300 g/ha (Ultracide)


R E A L I S E Z le traitement après la précoupe si vous devez faire cette opération très prochainement.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42


Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

ligne blanche dorsale

petite larve vert-clair



larve de phytonome




Adulte de 3-4 mm bleu noir métallique

Apion

Les DEGATS sont d'autant plus à craindre que la végétation est peu développée.

CHAQUE PARCELLE EST UN CAS PARTICULIER



FILET FAUCHOIR



UTILISATION DU FILET

POUR INTERVENIR A LA DATE OPTIMALE FAITES LES DENOMBREMENTS VOUS-MEMES DANS VOS PARCELLES EN UTILISANT UN FILET FAUCHOIR (5 fois 5 coups)